


**Tabella tratta da L'Informatore Agrario n. 3/2007: pag. 51.**

La lista delle varietà è redatta ogni anno dal CRPA di Reggio Emilia sulla base dei dati pluriennali raccolti in numerose prove sperimentali condotte in Emilia Romagna e regioni limitrofe.

**TABELLA 7 - Liste varietali per l'erba medica (anno 2007)**

Varietà	Anno di iscrizione	Referente commerciale	Produttività (1)	Longevità
<b>Lista A</b>				
4 Cascine	1992	Sivam	buona	elevata
Azzurra	2003	Società Italiana Sementi	elevata	buona
Classe	1997	Consorzio Nazionale Sementi	media	buona
Delta	1970	Società Italiana Sementi	buona	buona
Garisenda	1976	Società Italiana Sementi	elevata	elevata
Gea	1992	Continental Semences	media	buona
Iside	1994	Pasini Franco	buona	buona
Isola	2001	ApsovSementi	media	buona
La Torre	1994	ApsovSementi	buona	buona
Letizia 	1998	Cgs Sementi	buona	buona
Minerva	2004	Società Produttori Sementi	media	media
PR57N02	1999	Pioneer Hi-Bred Italia	elevata	buona
Prosementi	1973	Società Produttori Sementi	elevata	molto elevata
Robot	1978	Società Italiana Sementi	buona	elevata
Triade	1990	Limagrain Italia	media	buona
Zenith	2000	Monsanto Agricoltura Italia Asgrow	media	buona
<b>Lista B</b>				
Barlydia	1999	Padana Sementi	media	buona
Equipe (2)	1978	Società Italiana Sementi	media	buona
Ferri (3)	1995	Ferri Luigi Sementi	media	elevata
Friigo	2004	Padana Sementi	media	buona
Gamma	1998	Agroservice	media	media
Gigante Romea (3)	1995	Ancarani Pasquale	media	buona
Hystory	1999	Limagrain Italia	(4)	buona
Legend	1993	Pasini Franco	(4)	buona
Linfa (5)	1997	Sivam	media	buona
Pomposa	1992	Sefobi	media	buona
Selene	1982	Monsanto Agricoltura Italia Asgrow	media	elevata
<b>Lista cultivar emergenti</b>				
Casalina 	2004	Cgs Sementi	media	
Emiliana	2001	Continental Semences	buona	
La Rocca	1972	Sementi Samoggia	buona	
Picena GR 	2005	Cgs Sementi	media	

(1) La produttività viene determinata secondo i seguenti livelli produttivi espressi in percentuale sull'indice medio generale (IMG): IMG 101-103 = media; IMG 104-106 = buona; IMG > 107 = elevata. (2) Consigliata nella pianura occidentale della regione Emilia-Romagna. (3) Scarso adattamento ai terreni sub-acidi. (4) Resa inferiore alla media; varietà multifogliata. (5) Buon adattamento ai terreni sub-acidi.